

# AVERTISSEMENTS agricoles



## GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 15 du 17 JUILLET 1992

### BETTERAVE SUCRIERE

Absence d'oïdium.

Fiche couleur "*stratégie de lutte et produits de traitements*".  
Pucerons épis : à surveiller localement.

### POIS de CONSERVE

Tordeuses : Fin des interventions.

### MAIS

Nombreux pucerons.

### BETTERAVE SUCRIERE

► **SITUATION** : Aucun symptôme d'oïdium observé actuellement.

► **PRECONISATION** : Intervenir avec du soufre dès l'apparition des premiers symptômes d'oïdium ou attendre un prochain avis. Si un traitement au soufre était nécessaire courant Juillet, celui-ci demanderait à être renouvelé trois semaines plus tard par un produit polyvalent pour les arrachages tardifs.

### POIS DE CONSERVE

► **TORDEUSES** : Poste de Cappelbrouck : 96 captures du 29/06 au 6/07 avec un pic de vol le 30 Juin, depuis captures très faibles.

Fin des captures pour les quelques autres postes encore en place.

P 310

ministère de **agriculture** et de la **foret**




D.R.A.F. - S.R.P.V.  
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE : (dont Avertissements Agricoles)  
Z.A.L. du Grand Mont - Rue B. Palissy - B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement  
annuel :  
A l'ordre  
Régisseur de Recettes  
D.R.A.F. Nord-Pas-de-Calais  
ISSN 0758-7988 - CPPAP N°1885 AD

## MAIS

► **SITUATION** : Très forte colonisation par *Sitobion avenae* (puceron des épis des céréales) et *Metopolophium dirhodum* (puceron vert). Présence de quelques *Rhopalosiphum padi* (puceron noir, principal vecteur de la Jaunisse Nanisante de l'Orge).



► **PRECONISATION** : Aucune perte de rendement n'a été démontrée par le passé à ce stade avec la présence (spectaculaire) du *Sitobion avenae* et du *Metopolophium dirhodum*.

**NE PAS TRAITER SPECIFIQUEMENT CONTRE CES PUCERONS MAIS SURVEILLER PLUTOT L'EVOLUTION DU PUCERON NOIR APRES LE DEGAGEMENT COMPLET DU PANICULE.**

Un traitement précoce et avec une pyréthrianoïde seule, pourrait au contraire favoriser le développement de ces derniers, ce qui serait plus dommageable.

Laisser pour le moment agir les auxiliaires (coccinelles, syrphes...) qui sont déjà bien installés. Un certain pourcentage de pucerons est déjà détruit par les entomophthorales (champignons se développant par temps chaud et humide).

En fonction de l'évolution du puceron noir, dès le dégagement des panicules, un traitement sera à réaliser si une plante sur deux est colonisée et si les populations sont stables ou en évolution dans les quelques jours suivant la sortie des panicules. Utilisez PRIMOR G (0,250 kg/ha) par température supérieure à 20°C pour bénéficier de la bonne action de vapeur sur ce produit.



# MALADIES FOLIAIRES DE LA BETTERAVE : les produits de traitement

Matières actives	Spécialités commerciales	Doses spéc. par ha	Oïdium	Ramulariose	Cercosporiose	Rouille
flutriafol	Impact	1 l	● +++	● +++	● ++	● ++
carbendazime + flutriafol	Impact R Impact RM	1 l 0,8 l	● +++	● +++	● ++	● ++
difénoconazole	Geyser	0,5 l	● ++	● +++	● ++	● +++
cyproconazole + fentine acétate	Alto BS	2 kg	● ++	● +++	● ++	● +++
flusilazol + carbendazime	Punch CS	0,5 l	● +++	● +++	● ++	● ++
triadimenol + fentine hydroxyde	Pennsuc	1 l	● ++	● ++	● +	● ++
fentine hydroxyde + soufre	Topsuc	7 l	P +++ ● ++	P +++ ● ++	P ++ ● +	
carbendazime + fenpropimorphe + mancozèbe	Corvet CM	2 kg	● ++	● ++	● +	● ++
bitertanol	Baycor 300 EC	0,8 l	● +	● ++	● +	● ++
mancozèbe	Nombreuses spécialités	3200 g m.a./ha		●	P	●
fenpropimorphe	Corbel	1 l	● ++			
soufre micronisé	Nombreuses spécialités	6000 g m.a./ha	P ++			
carbendazime + fénarimol + manèbe	Rimidine plus	2,5 kg	● ++		●	
fénarimol	Rubigan 4	1 l	● ++			
carbendazime + manèbe + soufre	Volnèbe	8 kg	● ++			
carbendazime + manèbe + soufre micronisé	Blédor 3	8 kg	● ++			
fentine - acétate + manèbe	Brestan 10	2,5 kg		● ++	● +	
bénomyl	Benlate (1)	0,3 kg			●	
carbendazime	Nombreuses spécialités (1)	0,3 kg			●	
manèbe + thiophanate méthyl	Peltar (1)	2 kg			●	

(1) Produit à efficacité réduite sur Cercosporiose en situation de souches résistantes.

★ A confirmer :

Les niveaux d'efficacité et de rémanence ont été jugés sur une seule application dès l'apparition des premiers symptômes. Seuls, les produits marqués d'un P ont été traités en préventif.

Des techniques de contamination artificielle sont utilisées dans le cadre des expérimentations conduites sur Cercosporiose et Ramulariose.



EFFICACITE  
 ● : très bon (> 80 %)  
 ● : bon (< 80 %)  
 P : traitement préventif.

REMANENCE  
 +++ : Très rémanent (> à 45 jours)  
 ++ : Rémanent (30 à 45 jours)  
 + : Moyennement rémanent (< à 30 jours).

Par manque de référence, la rémanence de certains produits n'est pas indiquée.

7311

# PRINCIPALES MALADIES DE LA BETTERAVE : 3 stratégies possibles... mais 1 traitement principal



Dans le cas de deux traitements, ne pas utiliser la même matière active pour éviter les risques de résistance.



Ministère de l'Agriculture et de la Forêt  
Services de la Protection des Végétaux

Stratégie élaborée en collaboration avec l'I.T.B.